

## **PAYS DU GROUPE II :**

Angola, Argentine, Benin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République de Centrafrique, Colombie, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Equateur, Guinée équatoriale, Ethiopie, Guyane française, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guyane, Kenya, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Panama, Paraguay, Pérou, Rwanda, Soa Tome et Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Soudan, Surinam, Togo, Trinidad et Tobago, Ouganda, Tanzanie, Tchad, Venezuela

<b>VACCINATION</b>	<b>RECOMMANDATION OU EXIGENCE DE LA VACCINATION</b>
<b>Fièvre jaune</b>	Vaccination exigée des voyageurs âgés de plus d'un an provenant d'un pays endémique de la fièvre jaune. La vaccination doit être reçue au minimum dix jours avant le départ.
<b>Hépatite A</b>	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées voyageant ou travaillant dans un pays où l'hépatite virale A est moyennement ou hautement endémique. L'exposition peut être due par l'eau ou les aliments souillés.
<b>Typhoïde</b>	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées. L'exposition peut être due par l'eau ou les aliments souillés.
<b>Hépatite B</b>	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées voyageant ou travaillant dans un pays où l'hépatite virale B est moyennement ou hautement endémique.
<b>Diphtérie - Tétanos</b>	La mise à jour est recommandée pour tous les voyageurs et pour toutes les destinations
<b>Poliomyélite</b>	Recommandée pour les voyageurs adultes pour les longs séjours
<b>Méningite A/C/Y/W135</b>	Vaccination recommandée pour les voyageurs vers les pays endémiques de la méningite
<b>Rage</b>	Vaccination recommandée pour les voyageurs passant beaucoup de temps dehors spécialement dans les zones rurales et pour les personnes professionnellement exposées au risque de morsures par des animaux